



**Etablissement Hospitalier et Universitaire d'Oran**  
**Service d'Hémodiagnostique**  
**Chef de service. Pr M.CHEKKAL**  
**Unité d'Hémostase et Thrombose**

**Fiche de renseignements Activité anti-Xa**

**Identification du patient**

Nom : .....Prénom : .....

Age : .....

Service : .....

**Données pré- analytiques**

Heure d'injection de l'anticoagulant : .....

Heure de prélèvement : .....

**Données cliniques et thérapeutiques**

COVID-19 : Oui /\_ / Non /\_ /

Si oui, quelle forme clinique ? : bénigne /\_ / modérée /\_ / sévère /\_ / critique /\_ /

Si non, quelle est l'indication du traitement anticoagulant ? .....

Nom de l'anticoagulant : .....

Voie d'administration : S/C /\_ / perfusion IV continu /\_ / IV discontinu toutes les 2 heures /\_ /

Posologie : .....

**Médecin prescripteur**

**N.B**

- Le prélèvement doit être fait sur tube citraté conforme aux recommandations des examens d'hémostase
- Les patients à des doses préventives standards ne nécessitent pas de surveillance de l'activité anti Xa
- Le TCA est généralement suffisant pour la surveillance des HNF sauf dans certaines situations particulières de discordance entre la posologie et le résultat du TCA obtenu

	<b>Moment du prélèvement</b>	<b>Fréquence de la surveillance</b>
<b>HNF en IV continu</b>	Indifférent	Quotidienne et 4 à 6 heures après chaque changement de posologie
<b>HNF en IV discontinu</b>	Mi chemin entre 2 injections	
<b>HNF en S/C</b>	Mi chemin entre 2 injections	
<b>HBPM</b>	4h après injection	Début de la surveillance après la 3 <sup>ème</sup> injection, fréquence tous les 2 à 3 jours en fonction des résultats précédents